

鳥取県内での SFTS の発症について

お世話になっております。

6月8日に鳥取県内で初めて重症熱性血小板減少症候群(SFTS)の症例が確認されました。

発症が確認されたのは西伯郡在住の60代の男性です。大山町内の山中で複数回作業を行っていたそうです。現在も入院治療中です。

これからさらにマダニが増えてきます、SFTS以外にも色々な病気を持っていますので山に入られる際はご注意ください。よう会員に周知をお願いします。

山林での作業、農作業及びレクリエーションで野山や畑等に出かけるときは、マダニに刺されないよう次のことに注意してください。

- 肌を出来るだけ出さないよう長袖、長ズボン、手袋等をしましょう。
- 肌が出る部分や服の上からダニ忌避剤（ディート剤）を噴霧しましょう。
- 服は、ダニの付着が目立つ、白い色にしましょう。
- 地面に直接寝転んだり、腰を下ろしたりしないよう敷物をしましょう。
- 服にダニが付着している可能性があるため、車や自宅に入る前に服をはたき、帰った後はすぐ入浴し、体を良く洗い、新しい服に着替えましょう。
- 野山などに出かけられた後、体にマダニに刺されたと思われる刺し口がみられ、発熱等の症状が出た場合は、速やかに医療機関を受診してください。

<参考>重症熱性血小板減少症候群について


1 発生状況

平成23年に中国で初めて特定された、SFTS ウイルスに感染することにより引き起こされる病気で、ウイルスを保有しているマダニに咬まれることで感染します。

ウイルス自体は以前から国内に存在していたと考えられますが、平成25年1月に山口県で国内初の感染事例が確認されて以降、毎年60～90名前後の患者が報告されています（平成25年3月には感染症法上の四類感染症に指定）。

令和2年4月29日現在507名の患者が報告されておりうち66名が死亡しています。

SFTS症例の届出地域（n=507, 2020年4月29日現在）



出典：国立感染症研究所ホームページ（<https://www.niid.go.jp/niid/ja/sfts/3143-sfts.html>）

2 感染経路

多くの場合、ウイルスを保有しているマダニに咬まれることにより感染しますが、稀血液等の患者体液との接触により人から人への感染も報告されています。

3 症状

マダニに咬まれてから6日から2週間程度の潜伏期間を経て、主に発熱、消化器症状（食欲低下、嘔気、嘔吐、下痢、腹痛）が出現し、時に頭痛、筋肉痛、神経症状（意識障害、けいれん、昏睡）、リンパ節腫脹、呼吸器症状（咳など）、出血症状（紫斑、下血）を起こします。

4 対処方法

治療は対症療法しかなく、有効な薬剤やワクチンはありません。